



Rengørings- og desinfektionsmidler fra Antec DUPONT, UK.

AS Herregaard *Vildtopdræt* vil fra og med sæsonen 2008 være forhandler af specielle rengørings- og desinfektionsmidler fra **Antec DUPONT, UK** (www.antecint.co.uk).

AS Herregaard *Vildtopdræt* forhandler produkterne: **Biosolve® Plus**, **Ambicide™** og **Virkon® S** fra **Antec DUPONT, UK**.

Biosolve® Plus



Biosolve® Plus er et alkalisk rengørings koncentrat med meget effektiv fedtopløsende virkning og særdeles god vaskeevne. **Biosolve® Plus** er ideelt til anvendelse til rengøring af alle flader før desinfektion. Eksempelvis rugerier, fjerkræfarme o. lign., samt til alt udstyr og maskiner, der anvendes i industrien f.eks. maskiner, transportvogne, transportkasser, foderautomater osv.

Ambicide™



Ambicide™ er et bred spektret og bredt anvendeligt ikke korroderende desinfektionsmiddel.

Anvendelse.

Ambicide™ er ideelt at anvende i rugerier, opdrætshuse og opdrætsanlæg samt andre steder hvor, der er behov for bredspektret bekæmpelse af vira, bakterier, svampe og sporer.

Ambicide™ giver en fleksibel løsning på desinfektion af overflader, udstyr, maskiner og rugetæg ved lave temperaturer.

Brugsvejledning.

Overflade desinfektion.

Niveauet for tilbageværende sygdomsfremkaldende organismer kan selv efter grundig rengøring stadig være så højt, at det udgør et stort problem.

Det er derfor nødvendigt, udover rengøring, også at anvende et desinfektionsmiddel, der er dokumenteret effektivt mod vira, bakterier, svampe og sporer som eksempelvis **Ambicide™**.

Forstøvning.

Forbered en 0,5 - 1 % opløsning (1:200 - 1:100) af **Ambicide™** eller indstil det

Anvend eksempelvis rygsprøjte eller højtryksrensere. Anvendes højtryksrensere indstilles denne til det ønskede blandingsforhold (1:200 - 1:100) og lavest muligt tryk. Fordel desinfektionsopløsningen på en i forvejen rengjort overflade med ca. 300 ml pr. m².

Skumudlægning.

Forbered en 2 % opløsning (1:50) af **Ambicide™** eller indstil skumudlæggerens/højtryksrensers dosering (1:50).

Fordel desinfektionsopløsningen på en i forvejen rengjort overflade med ca. 250 ml pr. m².

Forrugere, klækkere og lokaler hvori der opbevares rugetæg.

Forbered en 1 % opløsning (1:100) af **Ambicide™** eller indstil eventuelt doserings udstyr på den anbefalede dosering. Anvend desinfektionsforstøver, rygsprøjte, skulderrøjte eller tilsvarende og brug opløsningen med ca. 40 ml pr. m³ dog indtil det lokale eller udstyr, der ønskes desinficeret er fugtigt.

Desinfektion af rugetæg ved dypning.

Forbered en 1 % opløsning (1:100) af **Ambicide™** og 38-41° C varmt vand i eksempelvis en ægvaskemaskine og dyp rugetæggene i 2 -3 min. inden disse placeres i rugetækker eller æggebakker.

Summarisk effektivitetsdata for Ambicide™.

Vira	Dosering
Avian Influenza Virus H3N2	1:100
Bakterier	
Acinetobacter anitratus	1:200
Bacillus cereus (spores)	1:20
Campylobacter jejuni	1:100

E. coli 0157	1:200
Enterococcus hirae	1:100
Klebsiella pneumoniae	1:200
Proteus vulgaris	1:200
Pseudomonas aeruginosa	1:100
Salmonella enteritidis	1:200
Salmonella typhimurium DT104	1:200
Staphylococcus aureus	1:100
Svampe og sporer	
Aspergillus fumigatus	1:200
Aspergillus niger (Spores)	1:200
Candida albicans	1:200

Forholdsregler.

- Undgå at **Ambicide™** koncentratet eller opløsningen kommer i kontakt med øjne eller hud.
- Undgå at indånde den forstøvede opløsning.
- Anvend egnet beskyttende påklædning, handsker, støvler, ansigtsmaske og åndedrætsværn.
- Opbevares utilgængeligt for børn.

Førstehjælpsforanstaltninger.

- Hvis **Ambicide™** koncentratet eller opløsningen kommer i øjnene, skyl grundigt med rigeligt rent vand og søg lægefaglig vejledning.
- Hvis **Ambicide™** koncentratet eller opløsningen kommer på huden fjernes det omgående med rent vand.
- Hvis **Ambicide™** koncentratet eller opløsningen indtages drikkes rigeligt vand, undgå at fremprovokere opkastning. Søg læge.

Opbevaring: Køligt og tørt uden umiddelbar kontakt med andre produkter.

Holdbarhed: Koncentrat 3 år. Opløsning ca. 1 uge.

Pakning: 20 liters dunk.

Virkon® S



Virkon® S er et patenteret, letopløseligt desinfektionsmiddel i gruppen oxyderende midler. Anvendes til desinfektion af stalde, opdrætsanlæg, kenneler, transportvogne, redskaber, fodtøj, fodrings- og vandingsanlæg m.v.

Dokumenteret effektivt mod alle kendte vira, grampositive og gramnegative bakterier, sporer, mycoplasmer og svampe. Effektivt mod plantepatogene bakterier, mug og svamp. Kan anvendes i stalde, mens dyrene er til stede.

Virkon® S har en stor sikkerhedsmargin (LD50-4123 mg/kg ved indtagelse gennem munden). Efterlader ingen skadelige stoffer i miljøet. Effektiv selv ved lav temperatur (4° C).

Virkon® S er velkendt over hele verden og anvendt i de fleste lande.

Anvendelse

- Almindelig desinfektion efter grundig rengøring.
- Desinfektion af inventar: Efter grundig rengøring desinficeres staldinventar, foderanlæg, rugemaskiner, bure, fiskeredskaber m.v.
- Desinfektion af rør og tanke.
- Dokumenteret effektivt mod alle kendte vira, grampositive og gramnegative bakterier, sporer mycoplasmer og svampe. Effektivt mod plantepatogene bakterier, mug og svampe. Kan anvendes i opdrætsanlægget, mens kyllingerne er til stede.

Brugsvejledning

Det letopløselige pulver hældes direkte i vand. Skal ikke blandes med andre kemikalier. Effekt nås ved 5-30 minutters kontakt tid (i praksis den tid, det tager at tørre).

Dosering	Opløsning	Virkon® S pr. liter vand
Alm. desinfektion	1 %	10 g
Desinfektion ved parvovirus	1 %	10 g
Rengøring og desinfektion af instrument (lad virke i max 10 min)	0,5-1 %	5-10 g
Vandtanke og rør (opløsningen står i	0,25-1,0 %	2,5-10 g

anlægget i 30 minutter, skylles og tømmes for udfældning)		
Kontinuerlig desinfektion af drikkevand	0,1 %	1 g

Udbringning

Virkon® S udbringes efter rengøring med:

- Eget sprayudstyr med lavt tryk. Eksempelvis rygsprøjte, motorsprøjte eller kande med spredebom.
- Medicinblander. Stamopløsning (max 6 %). Efter opløsningen sker ingen udfældning.
- Vask med klud eller børste

Forsigtig

Pulveret er lokalirriterende.

Bemærkning

Udbringningsudstyr rengøres efter brug. Opløsningen må ikke være i permanent kontakt med bløde metaller (bl.a. aluminium og kobber) da korrosion kan forekomme.

Deklaration

Kaliummonopersulfat (23 %), sulfaminsyre (5 %), detergenter og hjælpestoffer. Indeholder 2,4 % aktiv ilt. Tilsat indikatorfarve for høj aktivitet (rød).

Opbevaring: Alm. Stuetemperatur, 15-25 °C. Tørt.

Holdbarhed: 3 år. Opløsning ca. 1 uge (så længe opløsningen er lyserød).

Pakning: Plastbeholder på 2½ kg, 5 kg, 10 kg.

For spørgsmål og uddybende oplysninger vedrørende **Antec DUPONT, UK** produkter kontakt AS Herregaard eller læs mere på www.antecint.co.uk.